

Hindi

शिशु को दूध पिलाने में मदद

(Help with Feeding)

यह हस्तपत्रक आपके बच्चे को दूध
पिलाने में मदद के तरीकों की गाइड
के तौर पर तैयार किया गया है
ताकि आप दोनों इस वक्त का
आनन्द उठा सकें। यह हस्तपत्रक
उस मदद की जगह नहीं ले सकता
जो आप तथा आपके बच्चे को
मैटर्निटी स्टाफ़ तथा स्पेशलिस्ट
नर्सों/हैल्थ विज़िटरों या विखण्डन
(क्लैफ़्ट) वाले आपके बच्चे की
देखभाल करने वाले माहिरों की टीम
(जिसे आम तौर पर क्लैफ़्ट टीम
कहा जाता है) से मिलनी चाहिए।

जन्म से ही विखण्डित हों और/या तालू वाले शिशुओं को दूध पिलाने में मदद

सभी नवजात शिशु अपने शुरू के हफ्ते दूध पीने तथा सोने में बिताते हैं। भूख व प्यास मिटाने के साथ-साथ, दूध पीने का वक्रत ऐसा होता है जब बच्चे और माता-पिता एक-दूसरे को जानना-समझना शुरू करते हैं। आपके बच्चे को अगर कोई अन्य समस्याएँ न हों, तो आपको अपने बच्चे से अलग नहीं किया जाना चाहिए।

दूध पीने के लिए, बच्चों को मुँह के अन्दर खाली जगह बनानी पड़ती है और जीभ को सही स्थिति में रखना पड़ता है। आम तौर पर यह चुचक के इर्द-गिर्द होंठों को अच्छी तरह बन्द करके तथा तालू से मुँह के पिछले भाग को बन्द करके किया जाता है।

विखण्डन वाले बच्चे शापद ऐसा अच्छी तरह न कर पाएँ और उन्हें कुछ अतिरिक्त मदद की जरूरत पड़ सकती है। पिअर रॉबिन सिन्ड्रोम के नाम से जाने जाने वाले छोटे निचले जबड़े वाले बच्चों को शुरू-शुरू में निगलने तथा सँस लेने में ताल-मेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है।

मदद के तरीके निम्नलिखित हो सकते हैं:

- माँ का दूध पिलाने के प्रति अलग दृष्टिकोण
- बड़े-बड़े या नए सुराखों वाले अलग आकार के टोट वाली बोतल
- बोतल से दूध पिलाने के लिए अलग किस्म की बोतल। मिसाल के तौर पर, दूध के प्रवाह को ठीक रखने में मदद के लिए नरम बोतल जिसे निचोड़ा जा सके या स्कूप लगी बोतल जिसके टोट को चूसने में बच्चे को ज्यादा जोर न लगाना पड़े।
- छोटे जबड़े वाले बच्चों को शुरू में नाक के जरिये एक पतली-सी ट्यूब डाल कर उसके पेट में दूध ले जाया जा सकता है।

विखण्डित तालू तथा अन्य कठिनाईयों वाले बच्चों को और अधिक मदद व सलाह की जरूरत पड़ सकती है। अगर किसी बच्चे को कुछ समय तक ट्यूब से दूध पिलाया जाता है तो क्लैस्ट टीम को यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुछ टीमों को लगता है कि अगर कोई

मैडिकल वजह न हो तो बच्चे को दूध चूसाने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

दूध चूसते हुए, विखण्डन वाले बच्चे सामान्य बच्चों के मुकाबले ज्यादा हवा निगल सकते हैं, खास कर तब अगर दूध का प्रवाह बहुत धीमा या बहुत तेज हो। अगर ऐसा होता है तो बच्चे के ऊपरी होंठ पर नीली-नीली मूँछ नजर आएगी या बच्चा बहुत ज्यादा सोएगा या कुछ दूध निकाल देगा।

अगर ऐसा होता है, तो दूध पिलाने वक्रत दो-तीन बार रुक कर बच्चे को ढकार दिलावा देनी चाहिए या बच्चे को गोदी में ज्यादा सीधा बैठाना चाहिए।

सभी बच्चों के जन्म के समय का 10 प्रतिशत भार घट सकता है लेकिन आम तौर पर ये दो-तीन हफ्तों के अन्दर-अन्दर ही यह भार पूरा कर लेते हैं। विखण्डित होंठ या तालू वाले बच्चों का भार बढ़ने में कुछ ज्यादा समय लग सकता है। अगर कोई बच्चा दिन में पाँच-छः नैपियाँ गीली कर देता है और नियमित रूप से टट्टी कर लेता है, स्वस्थ और चुस्त है, तो ये इस बात के संकेत हैं कि उसे पर्याप्त दूध पिलाया जा रहा है।

हर माँ तथा बच्चा निराले होते हैं, इसलिए सभी को कुछ पक्के नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहा जा सकता। कुछ बच्चे आसानी से दूध पी लेते हैं जबकि कुछ बच्चों को अपने अनुकूल तरीका ढूँढ़ने में ज्यादा समय लगता है भले ही उनका एक ही किस्म का विखण्डन हो। अपने बच्चे को दूध पिलाने वक्रत आराम से और निश्चिन्त हो कर बैठने की कोशिश करें। दूध पिलाने का कोई अन्य तरीका आजमाने से पहले, अपने बच्चे को एक तरीका सोखने के लिए पर्याप्त समय दें, और यह नोट कर लें कि दूध पिलाने में आपको मदद करने के लिए क्लैस्ट टीम का कौन-सा मੈम्बर आपके पास है, और अगर आपको कोई चिन्ता हो तो आप दुबारा उससे ही सम्पर्क करें।

विखण्डित होट वाले शिशु

माँ का दूध पिलाना

विखण्डित होट वाला बच्चा आम तौर पर माँ का दूध पी सकता है। कभी-कभी स्तन तथा होट के बीच सील बनने में कठिनाई होती है, लेकिन विखण्डन के मुताबिक स्तन को ढाला जा सकता है। अगर दूध पीते हुए सीटी की सी आवाज़ आ रही हो तो आम तौर पर इसका मतलब यह होता है कि बच्चे के मुँह में हवा जा रही है, अतः बच्चे की पोजीशन बदल लें। आपको दूध पिलाते हुए अपने बच्चे की पोजीशन बदल-बदल कर देखनी होगी और विखण्डन वाले बच्चों को दूध पिलाने के माहिरों से मदद लेनी होगी। यह आपकी क्लैफ्ट टीम में दूध पिलाने की सलाह देने वाला हो सकता है या स्थानीय CLAPA ग्रुप में कोई माँ हो सकती है। दूध का अच्छा प्रवाह रहना चाहिए जो स्तन की मालिश करने या स्तन पम्प इस्तेमाल करने से प्रोत्साहित किया जा सकता है। आपकी मिडवाइफ इसमें आपको मदद कर सकती है। याद रखें कि विखण्डन के बाँर भी कुछ बच्चों को माँ का दूध अच्छी तरह पीने में कठिनाईयाँ हो सकती हैं।

कुछ ऐसी पुस्तिकाएँ हैं जो विशेष रूप से उन माताओं के लिए लिखी गई हैं जो विखण्डन वाले अपने बच्चों को अपना दूध पिलाना चाहती हैं। (अन्य मदद देखिये)।

बोतल से दूध पिलाना

बोतल से अच्छी तरह दूध पीने में भी बच्चे को होठों को अच्छी तरह से बन्द करने की ज़रूरत होगी। कुछ बच्चे सामान्य बोतल तथा नरम टोट से अच्छी तरह दूध पी लेते हैं हालाँकि सुराख को बड़ा करने या नया सुराख करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। यह सुराख स्टैरलाइज्ड सूई या पेपरक्लिप से किया जा सकता है। सूई की नोक या पेपरक्लिप को ली पर तब तक गर्म कर लें जब तक यह लाल सुख नहीं हो जातो। यह बात यकीनी बना लें कि सूई कम से कम एक मिनट तक ली पर रहे ताकि गर्म करने के दौरान धातु पर बनी प्राकृतिक कार्बन जल कर ख़त्म हो जाए। अगर यह जल कर ख़त्म नहीं होती तो सूई से टोट पर काला निशान पड़ जाएगा जिसे हटाना मुश्किल होगा। अगर कोई बच्चा टोट को चूसने में काफी ज़ोर लगा रहा हो लेकिन 30 या 40 मिनट में भी दूध ख़त्म न कर सके, तो उसे ऐसी नरम बोतल से दूध पिलाना चाहिए जिसे भींच कर निचोड़ा जा सके।

डकार दिलाना

विखण्डित होट वाले बच्चे चूचुक या टोट को होठों से बन्द न कर सकने के कारण सामान्य से ज़्यादा हवा खींच सकते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसा जान पड़े कि उसके अन्दर हवा चली गई है, तो परिचय में बताए गए तरीके अपना कर देखें।

होठ के ऑपरेशन के बाद

होठ के ऑपरेशन के बाद आप अपने बच्चे को अपना दूध या बोतल से दूध पिला सकती हैं। लेकिन कुछ सर्जन थोड़े समय के लिए प्याली और चम्मच से बच्चे को दूध पिलाना बेहतर समझते हैं। इसके अलावा कुछ टीमों को यह भी लगता है कि टोट पर चूसने से होठ की मरम्मत को नुकसान हो सकता है। अपनी क्लैफ्ट टीम या वॉर्ड नर्स की सलाह ले लें ताकि आपके बच्चे को ऑपरेशन से पहले ही किसी तबदीली की आदत पड़ सके।

विखण्डित तालू या विखण्डित होंठ और तालू वाले बच्चे

तालू में विखण्डन का मतलब यह है कि आपका बच्चा अच्छी तरह दूध नहीं चूस सकता क्योंकि वह मुँह के भीतर खाली जगह नहीं बना सकता और जीभ को सही ढंग से नहीं हिला सकता।

प्लेट

सभी टीमें बच्चे को जन्म से ही फ्रीडिंग तथा ऑर्थोपीडिक प्लेट लगवाले के फ़ायदे पर सहमत नहीं हैं, इसलिए यह पता कर लें कि क्या आपके बच्चे के लिए प्लेट लगवानी आवश्यक है और यह क्यों आवश्यक है।

कुछ टीमें बच्चे के मुँह को छत पर एक छोटी-सी फ्रीडिंग प्लेट इस्तेमाल करती हैं। यह आपके ऑर्थोडोन्टिस्ट ने इन कारणों से बनाई होगी:-

- माँ का दूध पिलाने में मदद करने के लिए
- मुँह की छत पर नाजुक ऊतक की रक्षा करने के लिए
- बच्चे की जीभ को विखण्डन से बाहर रखने के लिए

ऑपरेशन से पहले विखण्डन को बन्द करने तथा तालू-मैल बैठाने के लिए टबाब डालने के लिए एक विशेष ऑर्थोपीडिक प्लेट इस्तेमाल की जा सकती है। समय-समय पर प्लेटों की जाँच करना या उन में फेर-बदल करना ज़रूरी है इसलिए ऑर्थोडोन्टिस्ट आपके बच्चे को नियमित रूप से देखना चाहेंगा।

डकार दिलाना

आम तौर पर जब हम कुछ निगलते हैं तो तालू बन्द हो जाता है ताकि हम अपनी नाक से हवा को न निगल सकें। विखण्डित तालू वाले बच्चे ऐसा नहीं कर सकते इसलिए वे दूध चूसते हुए हवा को निगल जाते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसा जान पड़े कि उसके अन्दर हवा चली गई है, तो परिचय में पहले बताए गए तरीके अपना कर देखें।

दूध नाक में प्रवेश कर सकता है जिससे बच्चे को छींक आ सकती है या अगर आपके बच्चे ने दूध निकाला है तो कुछ दूध नाक के ज़रिये निकल सकता है। आम

तौर पर आपका बच्चा खुद ही साफ़ हो जाएगा लेकिन कुछ टिशू या बिब भी अपने पास रखें!

माँ का दूध पिलाना

बच्चे को माँ का दूध पिलाया जा सकता है और अगर विखण्डन छोटा या तंग हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। स्तन को तालू वाले हिस्से में अच्छी तरह पकड़ कर रखें ताकि बच्चा इसे अच्छी तरह पकड़ सके और जीभ से चूचुक को चूस सके।

अगर आपके बच्चे को शुरू के दिनों में नरम स्तनों को चूसने का अभ्यास करने दिया जाता है, तो आपको अपने तथा अपने बच्चे के लिए आरामदायक पोजीशन का पता लगाना आसान हो जाएगा और बच्चे को पौष्टिक खीस से लाभ होगा। प्रसूति के 2-4 दिनों के बाद, जब स्तन भर जाते हैं तो बच्चे को दूध चूसना ज़्यादा मुश्किल लगेगा।

दूध का अच्छा प्रवाह बनाए रखना ज़रूरी है क्योंकि शायद आपका बच्चा इतनी अच्छी तरह स्तन न चूस सके कि प्रवाह बना रहे। दूध के प्रवाह को स्तनों की मालिश करके या पम्प इस्तेमाल करके बढ़ाया जा सकता है। आपकी मिडवाइफ़ आपको यह दिखा देगी कि आपको अपने स्तनों की मालिश कैसे करनी

चाहिए और अगर पम्प उपलब्ध न हो तो हाथ से स्तनों से दूध कैसे निकालना चाहिए। दूध पिलाने के बाद स्तनों को दबा कर निचोड़ना चाहिए ताकि उनकी अच्छी तरह मालिश हो सके। बच्चा अपनी प्यास चूस कर तथा बाद में दूध पी कर भूख मिटा लेता है जिसमें ज्यादा कैलरी होती है। हो सकता है कि आपके बच्चे को स्तनों से हाथ से निकाला हुआ दूध किसी अन्य तरीके से पिलाने को ज़रूरत पड़े क्योंकि चूसने से शायद उसे उतनी मात्रा में दूध न मिल पाए जो उसके पर्याप्त विकास के लिए आवश्यक है।

अगर आपका बच्चा ऑपरेशन से पहले आपका दूध चूसने में समर्थ नहीं है, तो यह सम्भव है कि उसे चूचुक पर लगा दूध चखने-चाटने दिया जाए और फिर स्तनों से निकाले गए दूध को उसे किसी अन्य तरीके से पिला दिया जाए। कुछ माता-पिताओं को ऐसा करने से काफी सन्तुष्ट होती है।

बच्चे को दूध पिलाने के बहुत से अन्य वैकल्पिक तरीके हैं जैसे प्याली और चम्मच से, प्याली से तथा अनुपूरक नर्सिंग सिस्टम। स्तनों से दूध निकालने के लिए पम्प लिये जा सकते हैं और बच्चे को माँ का दूध पिलाया जा सकता है। इस सिलसिले में अपनी मिडवाइफ़, क्लेफ़्ट टीम के फ़ीडिंग एडवाइजर या CLAPA सैंपलर से बातचीत करें।

एक समय पर एक हफ़्ते के लिए किसी तरीके की आजमाइश करें और फिर स्थिति का जायज़ा लें और यह फ़ैसला करें कि क्या आप एक और सप्ताह तक इस तरीके को जारी रखना चाहती हैं।

माँ का दूध बच्चे को नाक और गले में नाज़ुक उतकों में उतनी जलन पैदा नहीं करता जितनी कि पाउडर वाला दूध करता है और माँ के दूध से बच्चे को कान को कोई समस्या पैदा हो जाने का ख़तरा कम हो जाता है।

कुछ ऐसी पुस्तिकाएँ हैं जो विशेष रूप से उन माताओं के लिए लिखी गई हैं जो विखण्डन वाले अपने बच्चों को अपना दूध पिलाना चाहती हैं। (अन्य मदद देखिये)।

बोतल से दूध पिलाना

कुछ बच्चों को ठीक-ठीक समय में, 30 से 40 मिनट के दौरान पर्याप्त दूध पीने में अतिरिक्त मदद की आवश्यकता पड़ेगी।

आपको बोतल के ऐसे टोट को ज़रूरत पड़ेगी जिसे आपका बच्चा अच्छी तरह से अपने मुँह में पकड़ सके और जिसमें दूध का अच्छा प्रवाह बना रहे। यह सामान्य बोतल से भी हासिल किया जा सकता है हालाँकि टोट के सुराख या सुराखों को बड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ और सुराख किये जाने की ज़रूरत होगी। (सुराख को बड़ा कैसे किया जाए या और सुराख कैसे किये जाएँ, यह जानने के लिए विखण्डित होट वाले बच्चों को बोतल से दूध पिलाने वाला सेशन देखिये।)

अगर आपका बच्चा धीरे-धीरे दूध पी रहा है, तो बोतल पर कुछ अलग क्रिम के टोट लगा कर देkhना आवश्यक हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चे ऑर्थोडॉन्टिक आकार वाले किसी खास टोट से बेहतर ढंग से दूध पी सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए ऑर्थोडॉन्टिक आकार वाला टोट इलेमाल कर रही हैं तो सुराख उधर करना चाहिए जिधर विखण्डन न हो और हल्का-सा जोध की तरफ़ हो ताकि दूध नीचे की तरफ़ निकले और विखण्डन से दूर रहे।

कुछ अन्य बच्चों को नरम बोतल की ज़रूरत होती है जिसे बच्चे द्वारा चूसने के बल दबा कर निचोड़ा जा सके ताकि दूध का प्रवाह बना रहे। इससे बड़े सुराख की बजाय आपका ज़्यादा नियन्त्रण रह सकता है। दूध पिलाने समय बच्चे को गोदी में अधिक सीधा बैठाने से दूध के प्रवाह को नियन्त्रित रखने तथा हवा नियमने को कम करने में मदद मिल सकती है।

कुछ बच्चों में शायद टोट से दूध चूसने को ताकत न हो, ऐसे में प्याली और चम्मच से दूध पिलाने का तरीका सहायक हो सकता है। रोस्टी स्कूप से दूध पीने में बच्चे को कम प्रयास करना पड़ेगा।

तातू के ऑपरेशन के बाद दूध पिलाना

तातू का ऑपरेशन करने का समय हर सैंटर में अलग-अलग हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि विखण्डन को किस्म क्या है और आपका सर्जन किस प्रकार ऑपरेशन करता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके बच्चे का दूध छुड़वा लिया गया है लेकिन वह दूध तथा अन्य तरल पीने के लिए अभी भी बोलत इस्तेमाल कर रहा है।

कुछ क्षेत्रों में सर्जन यह ठोक समझता है कि आप अपने बच्चे के तातू के ऑपरेशन के फौरन बाद उसे बोलत से दूध न पिलाएँ, इसलिए अपनी टीम से सलाह ले लें क्योंकि यह आवश्यक हो सकता है कि ऑपरेशन से पहले आप अपने बच्चे को चम्मच वाले बोलत से या छोटे स्पाउट वाले ट्रेनर कप से दूध पिलाने को आदत डालें। डम्मी पर भी यही बात लागू हो सकती है।

दूध छुड़ाना

आम तौर बच्चों का दूध छुड़ाना आरम्भ करने का वक़्त तब होता है जब वे लगभग चार महीने के हो जाते हैं। इसका सही-सही वक़्त तो आपके बच्चे पर ही निर्भर करेगा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे को विखण्डन है या नहीं। बच्चे की ख़ुराक उसके विकास की अवस्था के मुताबिक़ होनी चाहिए। आम तौर पर बच्चे को शोरबा (पूरी) देना आरम्भ करें और 6 से 9 महीने के बीच उसे मैश किये गए भोजन खिलाने शुरू करें। अपनी हेल्थ विज़िटर की सलाह अवश्य ले लें। इसमें विलम्ब कर देने से बाद में बच्चे को ठोस ख़ुराक शुरू करने में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। दूध की तरह ही, भोजन बच्चे की नाक में प्रवेश कर सकता है जिससे उसे छींकें आनी शुरू हो सकती हैं। पहले-पहल यह कष्टदायक हो सकता है लेकिन चिन्ता मत कीजिए और बच्चे को साफ़ करने के लिए एक बिब तथा कुछ टिशू अपने पास रखें। आपका बच्चा शीघ्र ही खाना सीख जाएगा। भोजन खिलाने के बाद बच्चे को कुछ पीने के लिए दे दें ताकि विखण्डन वाले भाग से भोजन साफ़ हो जाए।

बच्चे को 'टीचर बीकर' देना शुरू करते हुए, कुछ सैंटर नरम स्पाउट वाला बीकर पसन्द करते हैं जबकि कुछ अन्य सैंटर छोटे स्पाउट वाला बीकर बेहतर

समझते हैं ताकि यह तातू को मरम्मत को न छू सके। बीकर के डबकन पर छोटा-सा सुराख़ कर देने से बच्चे को पीने में मदद मिलेगी।

सामान्य सलाह

हॉट में विखण्डन से मसूड़े तथा जबड़े को हड्डी के बीच जहाँ दाँत निकलते हैं, दरार पैदा हो सकती है। इससे आगे वाले दाँत मुड़े हुए तथा गलत पंजीशन में निकल सकते हैं। यह आवश्यक है कि आपके बच्चे के दाँत मजबूत हों क्योंकि उन्हें सीधा करवाने के लिए बाद में उपचार की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चे के दाँत मजबूत रखने के लिए उसके लिए चीनी को मात्रा कम रखें, शरबत वाली ड्रिक्स न पिलाएँ तथा चीनी मिली दवाएँ न दें और भोजन के बाद विटामिन दें। अपने बच्चे का दूध छुड़ाते हुए, उसे विविध तथा सन्तुलित ख़ुराक देने की कोशिश करें। प्रोत्राइट ड्राईस की आवश्यकता के बारे में आपका डैन्टिस्ट आपको सलाह देगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पानी की सप्लाय में पहले से ही इसकी कितनी मात्रा है।

अन्य मदद

स्तनपान कराने के बारे में पुस्तिका:-

विखण्डित हॉल या विखण्डित तालू वाले बच्चे को दूध पिलाना
(लीफ़्लैट नम्बर 122)

La Leche League Books,
160 Blenheim Street, Hull HU5 3PN
Tel:- (0171) 242 1278 (24hr answerphone)

दूध पिलाने की बोतलें और टोट (चुसनी)

दूध पिलाने की बोतलें और टोट आपके मैटर्निटी यूनिट, आपकी क्लैफ़्ट टीम के फ़ीडिंग एडवाइजर या स्थानीय CLAPA ग्रुप से उपलब्ध हो सकते हैं।
इन्हें इस पते से भी ख़रीदा जा सकता है:-

Cleft Lip and Palate Association

1st Floor, Green Man Tower
332 Goswell Road
London EC1V 7LQ

Tel - 020 7833 4883
Web - www.clapa.com

अनुरोध करने पर एक मुफ़्त कैटालॉग तथा मूल्य-सूची उपलब्ध है।

CLAPA के अन्य हस्तपत्रकों के विवरण तथा स्थानीय सॉपॉर्ट ग्रुप्स के बारे में जानकारी के लिए लंडन ऑफ़िस से सम्पर्क करें।

इस हस्तपत्रक को तैयार करने में मैनेजिस्टर तथा नौटिंघम की क्लैफ़्ट टीमों की मदद के लिए CLAPA आभारी है।