

Punjabi

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਚ ਮਦਦ

(Help with Feeding)

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ
ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਪਣੇ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ
ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ “ਕਲੈਫਟ”
(ਖੰਡੇ) ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ
ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਰਸਾਂ/ਹੈਲਥ
ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਜਾਂ “ਕਲੈਫਟ” ਟੀਮ ਦੇ
ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ
ਲਈ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤਰੇੜੇ ਹੋਏ ਬੁਲ੍ਹ (ਖੰਡੇ) ਤੇ/ਜਾਂ ਤਾਲੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਚ ਮਦਦ

ਸਾਰੇ ਨਿਆਏ ਅਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕੁੱਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ।

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ/ਪੀਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਰਤੇ। ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਦੁਆਲੇ ਬੁਲ੍ਹ ਘੁਟ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਾੜੀ ਤਾਲੂ ਥੱਦ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੰਡੇ ਬੁਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਦੀ ਅੱਖਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਜਥਾੜਾ/ਬੁਟ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ (ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੀਅਰ ਰੇਬਿਨ ਸਿੰਡਰਮ - ਕਸਰ - ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਲੱਘਾਉਣ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਅੱਖਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਦਦ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ:-

- ਛਾੜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੰਘਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਬੋਤਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਛੋਕਾ ਤੇ ਵਖਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ 'ਡੰਡੀ' (ਟੀਟ) ਹੋਵੇ।
- ਵਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਹਾਅ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਜਦ ਬੱਚੇ ਚ ਟੀਟ ਤੋਂ ਚੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 'ਸਕੂਪ' ਲਗੀ ਬੋਤਲ।
- ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਜਥਾੜਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਤਲੀ ਨਾਲੀ (ਟੀਊਬ) ਛਿੜ ਵਿਚ ਲਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੰਡੇ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ

ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਟੀਊਬ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਲੇਫਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘਣ ਦੇਣ ਚ ਦੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਖੰਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲੱਘਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਬੁਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪਤਲੀ ਨੀਲੀ ਲੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਉਛਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੁਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਦਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ 10% ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਫੇਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬੁਲ੍ਹ ਜਾਂ ਤਾਲੂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੋਰ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਰ ਨੈਪੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰ ਮਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਚ ਦੋਰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਕ ਢੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੋਖ ਲਵੋ ਤੇ ਕਲੇਫਟ ਟੀਮ ਦੇ ਉਸ ਜੱਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਖੰਡੇ ਬੁਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ

ਖੰਡੇ ਬੁਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧੀ ਨੂੰ ਘੁਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੁਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧੀ ਨੂੰ 'ਚਾਲਿਆ' ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੜ੍ਹਕੇ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹਵਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਫਟ ਟੀਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕਲਾਪਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਰਾਅ ਨਾਲ ਛਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਪੰਪ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਰਾਅ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ (ਮਿਡਵਾਈਫ) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਤੇ ਅੱਖਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੰਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਮਦਦ)

ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ

ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੋਤਲ ਦੀ ਨਿਪਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੁਲੀ ਨਿਪਲ ਵਾਲੀ ਆਮ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਛੋਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੂਈ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਜਾਂ ਪਿਨ ਬਲਦੀ ਲਾਟ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਤਕ ਘਟੋ ਘਟੋ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤਕ ਤੰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਾਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਬਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨਾ ਬਲੇ, ਤਾਂ ਨਿਪਲ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਰ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੱਚਾ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬੋਤਲ ਚੁੰਘ ਕੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਘਣ ਤੇ ਅੱਖਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲਚਕੀਲੀ ਕੁਲੀ ਬੋਤਲ ਛਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਕਾਰ ਦੁਆਉਣਾ

ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੋਡੀ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਦੀ ਨਿਪਲ ਨੂੰ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟ ਨਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਡ ਹਵਾ ਨਾਲ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ। ਬੁਲ੍ਹ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਬੁਲ੍ਹ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜਾਂ ਓਪਰਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਜਨ (ਡਾਕਟਰ) ਕੰਪ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਤ ਦੀ ਚੁੰਘਟੀ (ਡੋਮੀ) ਨਾਲ ਬੁਲ੍ਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਕਲੈਫਟ ਟੀਮ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ, ਤਾਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੰਡੇ ਤਾਲੂ ਜਾਂ ਖੰਡੇ ਬੁਲ੍ਹ ਤੇ ਤਾਲੂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ

ਤਾਲੂ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣਾ ਚ ਅੱਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੀਭ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ।

ਪਲੇਟਾਂ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਫਟੇ ਤਾਲੂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰਥੋਡਾਂਟਿਸਟ

- ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣਾ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
- ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਤਾਲੂ ਵਾਲੀ ਨਰਮ ਥਾਂ (ਟਿਊ) ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰਖਣ ਲਈ
- ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲੂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਓਰਥੋਪੈਡਿਕ ਪਲੇਟ ਜੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਰਥੋਡਾਂਟਿਸਟ ਜੜੀ ਹੋਈ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਕਾਰ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਅ ਨਿਗਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਥਾਣੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਢਿਡ ਚ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲੂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਤਾਲੂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਏਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਢਿਡ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ।

ਦੁੱਧ ਨੱਕ ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਿਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਬੂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨੱਕ ਚ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਬਿਬ ਤਿਆਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ

ਜੇ ਬੁਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦੇਂਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਡੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟ ਕੇ ਚੁੰਘ ਸਕੇ।

ਜੇ ਜਟੇਪੇ ਮਗਰਲੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਆਖਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਛਾਤੀਆਂ ਚੁੰਘਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਟੇਪੇ ਮਗਰੋਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਉਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਏਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਚ ਅੱਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੁੰਘ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਹਾਅ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਤੇ ਜੇ ਪੰਪ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੋਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਗਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧ ਗਿਜ਼ਾਈ (ਕੋਲੋਰੀਆ ਵਾਲਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।

ਜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੁੰਘ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਡੋਡੀ ਦੇ ਸਿਮੇਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰੱਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗ ਹਨ। ਕੱਪ ਤੇ ਚਮਚੇ ਵਾਲਾ, ਕੱਪ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਰਸਿੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਦੁੱਧ ਕਢਣ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਕਰਾਏ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਪਣੀ ਦਾਈ, ਕਲੇਫਟ ਟੀਮ ਦੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਲਾਪਾ ਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫੇਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨੱਕ ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚਮੜੀ (ਟਿਸ਼ੂ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਓਪਰਾ ਦੁੱਧ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਖੰਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਮਦਦ)

ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ

30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਐਲੀ ਚੁੰਘਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਟ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਹਾਅ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੁਲੀ ਨਿਪਲ ਵਾਲੀ ਆਮ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੇਕ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਛੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਛੇਕ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਛੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਡੇ ਬੁਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹੋ।)

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਘਣੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਰਥੋਡੋਂਟਿਕ ਚੁੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੇਕ ਓਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੋਰਤਾ ਸਿਹਾ ਜੀਭ ਵਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਬੁਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨਹੀਂ।

ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਰਾਅ ਵਧ-ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਲਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੰਘਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਪ ਤੇ ਚਮਚਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਰੋਸਟੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਚਮਚਾ (ਸਕੂਪ) ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਘਟ ਜੋਰ ਲਗਾਏ।

ਤਾਲੂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ

ਤਾਲੂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰੋਂ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਚੇ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ ਟੋਟੀ (ਸਪਾਊਟਡ) ਵਾਲਾ ਕਪ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਚੁੰਘਟੀ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਛਡਾਉਣਾ

ਬੱਚਾ ਜਦ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਖੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦਲੀਆ (ਪੀਉਰੀ) ਦੇਂਦੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਲੀਦਾ ਕੀਤੀ (ਮੇਡਡ) ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਦਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਾਹ ਠੋਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਚ ਅੱਖਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਥੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖਤਾ ਜਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਬਿਥ ਤਿਆਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੱਤੀ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਿਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਟੀਚਰ ਬੀਕਰ' ਨਾਲ ਡਰਿੰਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਨਰਮ ਟੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬੀਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਕੀ ਟੋਟੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਕਿ ਤਾਲੂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਛੱਤੀ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਬੀਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਢੱਕਣ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਸਲਾਹ

ਬੁਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਪਾਤ ਨਾਲ ਜਥਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਬੁੱਟ ਵਿਚ ਵਿਰਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੰਦ ਵਿੰਗ-ਤਿੱਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਥਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਟ ਖੰਡ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਿੰਕਾਂ ਨਾ ਪੀਣ ਦਿਓ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖੰਡ ਬਗ਼ੈਰ ਦਿਓ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਛਡਾਉਣਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਨ-ਸੁਵੱਨੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਸਾਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ (ਡਰੋਪਸ) ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਦਸ ਦਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਮਦਦ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚਾ:-

ਤਰੇਤੋਂ ਹੋਏ ਬਲੂ (ਖੰਡੇ) ਜਾਂ ਤਾਲੂ ਵਾਲੇ ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

(Leaflet No. 122)

La Leche League Books,

160 Blenheim Street, Hull HU5 3PN

Tel:- (0171) 242 1278 (24hr answerphone)

ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਚੁੰਘਟੀਆਂ

ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਚੁੰਘਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਯੂਨਿਟ, ਅਪਟੀ ਕਲੈਫਟ ਟੀਮ ਦੀ

ਫੀਡਿੰਗ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕਲਾਪਾ ਟੀਮ ਤੋਂ

ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇਸ ਪਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-

Cleft Lip and Palate Association

1st Floor, Green Man Tower

332 Goswell Road

London EC1V 7LQ

Tel - 020 7833 4883

Web - www.clapa.com

ਮੁਫਤ ਕੋਟਾਲੋਗ ਤੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਆਖ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ 'ਕਲਾਪਾ' ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸੁਪਰਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ

ਲੰਡਨ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕਲਾਪਾ' ਵਾਲੇ

ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਤੇ ਨੈਟੀਐਮ ਦੀਆਂ ਕਲੈਫਟ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ।